

Dokumenttyp Rutin	Ansvarig verksamhet Smittskydd Värmland	Version 2	Antal sidor 2
Dokumentägare Ann-Mari Gustavsson	Fastställare Ingemar Hallén	Giltig fr.o.m. 2019-09-16	Giltig t.o.m. 2021-09-16

Handläggning av patient med bärarskap av ESBL-bildande bakterier – kommunal vård

Gäller för: Värmland



Tillämpa basala hygienrutiner

Nödändig medicinsk behandling eller omvårdnad får aldrig fördröjas eller undanhållas patient på grund av misstänkt eller konstaterat bärarskap av ESBL.

ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är ett samlingsnamn för enzymer som kan bryta ned flera av de antibiotika som vanligtvis kan användas för behandling av exempelvis urinvägsinfektioner. Tarmbakterier inom gruppen Enterobacteriasae utgör majoriteten av de bakterier som kan bära på ESBL, främst E.coli eller Klebsiella.

Smittspridning

Tarmbakterier sprids som direkt eller indirekt kontaktsmitta d.v.s. via händer, ytor och föremål.

Risker

En person som är ESBL-bärare och som inte har riskfaktorer löper mycket liten risk att sprida ESBL. Detta gäller även för person med KAD utan någon övrig riskfaktor.

Riskfaktorer för smittspridning

- Diarré/faecesinkontinens
- Stomi med ökat flöde
- KAD/RIK i kombination med annan riskfaktor
- Urininkontinens med läckage till omgivningen
- Dränage och andra penetrerande slangar (utom PVK).
- Pyelostomi
- Oförmåga att medverka i givna hygienrutiner, till exempel hos dement patient.
- Infekterade och vätskande sår

Placering

Vårdtagare med ESBL utan riskfaktorer kan samvårdas med andra och dela toalett samt röra sig fritt och delta i aktiviteter. Uppmuntra till god handhygien.

Vårdtagare med ESBL med riskfaktorer (undantag KAD) ska vårdas i enkelrum med egen toalett. Vårdtagaren får röra sig fritt och delta i aktiviteter. Uppmuntra till god handhygien. Vårdtagaren ska använda sin egen toalett och eventuella sår ska vara täckta med förband.

Överflyttning till annan vårdinstans

Vid utskrivning till annan vårdinrättning inklusive kommunal vård ska denna i förväg informeras om att patienten är bärare av ESBL. Behandlande läkare är ansvarig för att så sker. Kontakta vid behov Smittskydd Värmland för planering.

Transporter

Det föreligger ingen smittrisk att transportera patient med ESBL i taxi. Enligt sekretesslagen har chauffören ingen rättighet att bli informerad om bärarskapet. Personal i ambulans och sjukvårdstransport ska informeras om patienten har ESBL med riskfaktorer.

Besökare

- Besökare ska tillämpa god handhygien med tvål och vatten alternativt handsprit.
- Besökare behöver inte använda skyddskläder.

Disk

Dysken ska ställas direkt i matvagn eller diskmaskin.

Textilier

Hos vårdtagare med riskfaktorer som innebär läckage av kroppsvätskor ska sänglinne, sovkläder och handduk byts minst två gånger/vecka samt vid behov. Patientens textilier tvättas separat. Smutstvätt förvaras i påse eller tvättkorg.

Avfall

Hanteras som vanligt avfall.

Daglig städning

- Använd vanligt rengöringsmedel.
- Kontaktytor i patientens rum och toalett torkas dagligen med ytdesinfektionsmedel.

Slutstädning

- Rengöring och desinfektion av all utrustning som använts.
- Oanvänt material för engångsbruk kasseras, glöm inte toapapper.
- Om vårdtagaren har riskfaktorer ska slutstädning göras med Virkon 1 %, annars med rengöringsmedel och vatten.
- Desinfektera städutrustning.