

Mastoiditer
ÖNH,CSK
2010-2014

- Under åren 2010 fram till maj månad 2015 så har vi haft åtta patienter som fått diagnosen mastoidit.
- Sex stycken barn mellan 1 till 15 år, friska sedan tidigare.
- De har inte haft mycket besvär med sina öron tidigare, insjuknat hastigt med hög feber, utstående öra och rodnad ev. fluktuerande svullnad bakom örat.
- Två patienter, 15 resp. 40 år insjuknade med rinnande öra och hade kolesteatom som bakomliggande orsak till sin mastoidit och båda blev opererade.

- På fem stycken av de sex barnen odlades det på mellanöresekret efter paracentes eller från spontan trumhinneperforation.
- 3 st : ingen växt i mellanöresekret.
- 1 st: GAS
- 1 st: Pseudomonas
- 1 st: NPH odling visat växt av Pneumokocker, resistent mot PcV och Trimsulfa, intermediärkänsliga mot PcG
- 1 st: NPH odling visat växt av pneumokocker och Moraxella – ingen resistens.

- Samtliga lades in med Cefotaximbehandling, bred paracentes i trumhinnan och de svarade snabbt på behandling.
- Det barn som hade resistenta pneumokocker genomgick även mastoidektomi.